

WURZELSTOCK

Aufnahme Wasser und Mineralien
Verankerung des Rebstocks,
Quelle von Kraft und Lebensdauer

SORTEN

Vitis vinifera
Amerikanische Unterlage

7 ZUGELASSENE REBSORTEN

Weissweine: **Chardonnay**, Pinot blanc, Petit Meslier, Arbane und Pinot gris.
Rotweine: **Pinot noir** und **Meunier**.

SPROSSRANKEN

Zweige, Blätter, Ranken
Photosynthese, Bestand und Wachstum des Rebstocks


WEINLESE

100 % manuell, während 2 bis 3 Wochen

4 REGIONEN

Vallée de la Marne, Montagne de Reims,
Côte des Blancs, Côte des Bar

PINOT NOIR



MONTAGNE DE REIMS CÔTE DES BAR

Austrieb*: 2. Reifung*: 1.

Fünfeckiges Blatt,
Stielbucht V-förmig

CHARDONNAY




CÔTE DES BLANCS • CÔTE DE SÉZANNE COTEAUX VITRYATS • MONTGUEUX

Austrieb*: 1. Reifung*: 3.

Vollständiges Blatt,
U-förmige Stielbucht

MEUNIER



VALLÉE DE LA MARNE

Austrieb*: 3. Reifung*: 2.

Junge,
flaumige Blätter

* durchschnittliche Daten aus dem Gebiet der AOC Champagne

4 ZUGELASSENE SCHNITTSYSTEME

ZIEL: GLEICHGEWICHT ZWISCHEN KRAFT UND FRUCHTBARKEIT DES REBSTOCKS. SCHNITTDIPLOM ERFORDERLICH

CORDON DE ROYAT



Optimiertes Gleichgewicht
Blätter / Früchte

Verbreitet beim Pinot noir

CHABLIS



Gute Verteilung der Vegetation

Besonders geeignet für
Chardonnay

GUYOT



Einfacher und rationeller Schnitt

Für alle Rebsorten

VALLÉE DE LA MARNE



Begünstigt die Fruchterzeugung

Nur für Meunier zulässig



ICH KENNE AUF DIESER WELT NICHTS ERNSTERES ALS DEN WEINBAU.



VOLTAIRE