

根

水分とミネラル成分を吸い上げる ブドウ樹を定着させ、生命 力と長寿の源となる

品種

ヴィティス.ヴィニフェラ 台木はアメリカ種系品種

7種のセパージュのみ使用

白ブドウ:シャルドネ、ピノ.ブラ ン、プティ.メリエ、 アルバンヌ、ピノ.グリ

黒ブドウ: ピノ.ノワール、ムニエ

緑の部分

新梢、葉、巻きひげ 光合成、ブドウ樹の生育と維持


収穫

すべて手作業、2~3週間で収穫

4地区

ヴァレ.ド.ラ.マルヌ、 モンターニュ.ド.ランス、 コート.デ.ブラン、 コート.デ.バール


ピノ.ノワール



シャルドネ



ムニエ



モンターニュ.ド.ランス コート.デ.バール

発芽: 2番目 熟成: 1番目

葉は五角形で葉柄の裂刻(くぼみ)

は雄鶏のとさか型

* AOCシャンパーニュの平均データ

コート.デ.ブラン、コート.ド.セザンヌ ヴィトリー丘陵地帯、モングー

発芽: 1番目 熟成: 3番目

葉はほぼ円形で葉柄の裂刻(くぼみ) は大きく開いたU字形

ヴァレ.ド.ラ.マルヌ

発芽: 3番目 熟成: 2番目 若葉はうぶ毛におおわれてい

4種類の仕立て方に限定

目的: ブドウ樹の樹勢と結実のバランスをとるため。剪定には免許が必要。

コルドン・ド・ロワイヤ



シャブリ



ヴァレ・ド・ラ・マルヌ



葉と結実のバランス

ピノ. ノワールに多い



樹のバランスが良い

シャルドネに最適



ギュイヨ

シンプルで合理的な仕立て

全セパージュに可能



結実を促進

ムニエに限定



この世でブドウ畑での畑仕事にまさる重要な作業はない。